

Bilaga 1 Vägledning gällande akuta tandvårdsinsatser

Detta dokument ska ses som en hjälp vid bedömning av vilka tillstånd som bör behandlas inom ramen för ett akut omhändertagande.

Veckojour

- Akuta smärttillstånd med allmänpåverkan och/eller svullnad.
- Smärttillstånd av ej akut karaktär exempelvis bettfysiologiska besvär, "vassa kanter", ilningar/isningar. Kan omhändertas på veckojouren alternativt avvakta tills ordinarie vårdgivare är i tjänst om sådan finns.
- Akuta, infektiösa tillstånd i tänder och dess omgivning. Behandling kan vara i form av sanering av infektionsfoci, extraktion eller akut endodontisk behandling. Vid akut endodontisk behandling bör under besöket, eller tillsammans med ett snart återbesök, behandling genomföras så långt att tanden förses med ett långtidstemporärt inlägg.
- Traumatiska tandskador med pulpainvolvering, lägesförskjutning eller exartikulerad permanent tand.
- Större traumatiska tandskador utan pulpainvolvering.
- Blödning från tänder och dess omgivande vävnad som patienten själv ej kan stoppa.
- Lossnad tand- eller implantatstödd fast protetisk konstruktion. Kan omhändertas på veckojouren alternativt avvakta tills ordinarie vårdgivare är i tjänst om sådan finns.
- Partiell protes som gått förlorad eller skadats. Partiell protes bör lagas om reparationen är nödvändig för protesens funktion. Kan omhändertas på veckojouren alternativt avvakta tills ordinarie vårdgivare är i tjänst om sådan finns.
- Helprotes som gått förlorad eller skadats. Omhändertas på veckojouren alternativt avvakta tills ordinarie vårdgivare är i tjänst om sådan finns.

Helgjour

- Akuta smärttillstånd med allmänpåverkan och/eller svullnad.
- Akuta, infektiösa tillstånd i tänder och dess omgivning. Behandling kan vara i form av sanering av infektionsfoci, extraktion eller akut endodontisk behandling. Vid akut endodontisk behandling bör under besöket, eller tillsammans med ett snart återbesök, behandling genomföras så långt att tanden förses med ett långtidstemporärt inlägg.
- Traumatiska tandskador med pulpainvolvering, lägesförskjutning eller exartikulerad permanent tand.

- Större traumatiska tandskador utan pulpainvolvering.
- Blödning från tänder och dess omgivande vävnad som patienten själv ej kan stoppa.