

Dokumentnamn: Risktvätt		Revision: 04
Dokumenttyp: 8.5.0.1.1-5 rutin	Dokumentnummer: 24-586	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Programområde/Funktionsområde: LSG Patientsäkerhet	
Dokumentansvarig: LSG Patientsäkerhet	Beslut av: Hygienläkare	
Beslut datum: 2018-10-01	Nästa revidering: 2027-04-01	

Risktvätt

Med risktvätt som kräver separat hantering avses inom Region Blekinge och Region Kronoberg:

- Textilier som blivit förorenade med cytostatika från injektions- eller infusionslösning.
- Textilier som blivit förorenade med utsöndringar från patient minst 7 dygn* efter senaste cytostatikainjektionen/-infusionen.
- Textilier som blivit förorenade med större mängder blod ("drypande").

Utöver detta kan det tillkomma textilier som av Smittskydd/Vårdhygien anses utgöra en smittrisk efter vård/undersökning/behandling av särskilt smittsam patient. I förekommande fall utfärdas individuell anvisning av Smittskydd/Vårdhygien.

Hantering

- Lägg tvätten i vattenlöslig plastsäck
- Fyll inte säcken mer än till 2/3
- Förslut säcken med de knytband som finns på säcken.
- Den vattenlösliga plastsäcken läggs i en gul plastsäck märkt risktvätt
- Förslut säcken på vanligt sätt med förslutningsband

* Mer detaljerad information om utsöndringstid finns ofta i FASS, i cytostatikamaterialer och i särskilda broschyrer från läkemedelstillverkarna.